

Fortress* 8

(Bacterina Toxóide contra Carbúnculo Sintomático, Gangrena Gasosa, Enterotoxemia e Hemoglobínúria Bacilar dos Bovinos)

Uso Veterinário

Composição:

O produto consiste de culturas padronizadas e inativadas de *Clostridium chauvoei*, *C.novyi*, *C.haemolyticum*, *C.septicum*, *C.sordelli*, *C.perfringens*, tipos C e D, adicionadas de saponina como adjuvante.

Indicações:

É indicada para vacinação de bovinos sadios como um dos componentes da prevenção contra doenças causadas por *Clostridium chauvoei* – *septicum* – *haemolyticum* – *novyi* – *sordelli* – *perfringens*, tipos C e D nesta espécie animal.

Embora as infecções causadas por *C.perfringens* tipo B não sejam um problema significativo em muitos locais, imunidade também é provida por esta vacina, através da beta toxina do tipo C e do toxóide epsilon do tipo D.

Modo de usar e dosagens:

Agite antes de usar.

Utilize técnicas de assepsia para aplicar o produto.

Administre a dosagem de 5 mL por via subcutânea.

A vacinação inicial deve ser feita em duas doses com 4-6 semanas de intervalo entre elas. Proceda revacinação anual, com dose única.

Precauções e período de carência:

Conservar à temperatura entre 2 e 8 °C. Não congelar.

Usar todo o conteúdo do frasco depois de aberto.

Não vacinar dentro de 21 dias antes do abate.

Não usar em ovinos.

Inflamação transitória pode ocorrer no local da aplicação, após o uso do produto.

Como qualquer produto biológico, reação anafilática pode ocorrer após uso da vacina.

Nestes casos, usar epinefrina ou equivalente e terapia de suporte adequada ao caso.

Embora o produto tenha se mostrado eficaz nos testes de campo, alguns animais podem ser incapazes de desenvolver, ou manter, uma resposta imunológica adequada. Estes

Fortress* 8

(Bacterina Toxóide contra Carbúnculo Sintomático, Gangrena Gasosa, Enterotoxemia e Hemoglobinúria Bacilar dos Bovinos)

casos podem ocorrer se os animais estiverem estressados, mal nutridos, parasitados ou incubando alguma doença infecciosa.

Em áreas com alta incidência de *C.haemolyticum* recomenda-se revacinação semestral contra este microrganismo.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 5.892 em 05/03/97

Apresentação: Frasco ampola de vidro contendo 50 e 250 mL