

Rabivac[®]

Vacina anti-rábica

(Vírus rábico fixo, amostra PV, desenvolvido em células BHK, inativado)

Uso Veterinário

Generalidades:

Os conhecimentos atuais obtidos através do desenvolvimento da virologia, recomendam as culturas celulares específicas como substratos para a replicação de vírus em laboratório.

Rabivac[®] é uma vacina anti-rábica, de uso veterinário, desenvolvida industrialmente pelos Laboratórios Pfizer Ltda.

O vírus rábico é replicado em culturas de células BHK-21 clone 13, sob rigoroso controle técnico de laboratório em todas as fases do processo.

Após ter sido atingida a concentração máxima na cultura celular, os vírus são inativados por métodos modernos, comprovadamente não agressivos à sua imunogenicidade.

Esta vacina é preparada segundo as técnicas mais atualizadas e rigorosamente testada antes de ser liberada para o uso. Para um bom resultado na vacinação, é necessária a colaboração dos médicos veterinários, revendedores e criadores no atendimento às recomendações contidas na bula.

Modo de usar:

1. Tirar o disco de metal que recobre a tampa de borracha, desinfetando-a com álcool ou álcool iodado.
2. Agitar vigorosamente o frasco e, com seringa e agulha esterilizadas, retirar o volume de vacina indicado.

Indicações:

Profilaxia da raiva dos bovinos, ovinos, caprinos, eqüinos e muares.

Dose:

A dose é de 2 mL para bovinos, ovinos, caprinos, eqüinos e muares.

Via de aplicação:

Injetar por via subcutânea ou intramuscular na tábua do pescoço, em bovinos, ovinos e caprinos, após a desinfecção do local da aplicação com álcool iodado.

Rabivac®

Vacina anti-rábica

(Vírus rábico fixo, amostra PV, desenvolvido em células BHK, inativado)

Injetar por via intramuscular em eqüinos e muares, após a desinfecção do local da aplicação com álcool iodado.

Recomendações especiais:

1. Transportar e conservar a vacina entre 2°C e 8°C.
2. Não vacinar animais doentes ou mal nutridos, parasitados ou sob condições de “stress”.
3. Não vacinar animais com menos de 4 meses de idade.
4. Ter máximo cuidado com a assepsia.
5. Não utilizar vacina com prazo de validade vencido.

* O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou antiinflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação. Manter este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de reação anafilática administrar epinefrina ou equivalente.

Imunidade:

A imunidade específica instala-se ao redor de 21 dias após a vacinação. Para maior garantia profilática em nosso meio, os animais devem ser revacinados anualmente.

Nos animais primovacinação recomenda-se aplicar uma segunda dose 30 a 90 dias após a primeira dose.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n.º 666, em 18/08/78.

Apresentação: Frascos com 40 mL (20 doses).