

Terramicina®/LA Solução Injetável

Uso Veterinário

A Terramicina®/LA Solução Injetável é um produto estável, à base de oxitetraciclina dihidratada – antibiótico de amplo espectro, altamente ativo contra um grande número de microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, certas espécies de micoplasmas, riquetsias e protozoários.

A Terramicina®/LA Solução Injetável apresenta uma formulação contendo 200 mg de Oxitetraciclina dihidratada por mL. É rapidamente absorvida, mantendo um alto nível na corrente sanguínea por um período de 3 a 5 dias. É absolutamente estéril, não necessita de refrigeração e está pronta para uso.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Oxitetraciclina (dihidratada).....	20,0g
Veículo q.s.p.....	100,0 mL

Indicações:

Bovinos:

Para o tratamento de anaplasmose (*Anaplasma marginale*), pneumonia (*Pasteurella multocida*, *Haemophilus* sp, *Mycoplasma* sp, *Bordetella* sp, *Klebsiella* sp), leptospirose (*Leptospira* sp), podridão do casco (foot-root), difteria, metrite, mastite sistêmica (*Pasteurella* sp, *Bacillus* sp, *Streptococcus* sp, *Klebsiella* sp, *Mycoplasma* sp), enterite bacteriana (*E. coli*, *Salmonella* sp), actinobacilose (*actinobacillus* sp), artrite infecciosa (*E.coli*, *Salmonella* sp), feridas infecciosas, pericardite infecciosa, dermatofilose (*Dermatophilus congolensis*) e queratoconjuntivite infecciosa (*Moraxella bovis*).

Auxiliar no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Suínos:

Para o tratamento de pneumonia (*Pasteurella* sp, *Haemophilus* sp, *Mycoplasma* sp, *Bordetella bronchiseptica*), leptospirose (*Leptospira* sp), erisipela (*Erysipelothrix* sp), enterite bacteriana, artrite infecciosa e feridas infecciosas (*E.coli*, *Salmonella* sp).

Auxiliar no controle e prevenção da síndrome MMA (metrite-mastite-agalaxia) causadas por *E.coli* e *Klebsiella* sp em porcas, diarreia em leitões, e infecções pós-operatórias e pós-partos causadas por *E.coli* e *Salmonella* sp.

Terramicina[®]/LA Solução Injetável

Ovinos:

Para o tratamento da pneumonia (*Pasteurella multocida*, *Mycoplasma* sp, *Haemophilus* sp), aborto enzoótico, podridão do casco (foot-root), mastite sistêmica, metrite, artrite infecciosa, pericardite infecciosa e feridas infecciosas, causadas por *Pasteurella multocida*, *Bacillus* sp, *Streptococcus* sp, *Klebsiella* sp e *Mycoplasma* sp. Auxiliar no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-partos causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Caprinos:

Para o tratamento da pneumonia (*Pasteurella multocida*, *Mycoplasma* sp, *Haemophilus* sp), mastite sistêmica, podridão do casco (foot-root), pericardite infecciosa e feridas infecciosas causadas por *Pasteurella multocida*, *Streptococcus* sp e *Klebsiella* sp.

Aves:

Para o tratamento da Boubá Aviária e Doença Respiratória Crônica complicada, causadas por *Mycoplasma gallisepticum* e *E.coli*.

Coelhos:

Para o tratamento e prevenção de infecções causadas por *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *E. coli* e *Salmonella* spp.

Modo de usar e dosagem:

A Terramicina[®]/LA Solução Injetável é indicada pela via subcutânea ou intramuscular. Em leitões jovens (com menos de 10 kg), aves e coelhos, recomenda-se a via subcutânea.

Bovinos:

1 mL para cada 10 kg de peso. A injeção intramuscular deverá ser feita profundamente no músculo (coxa) ou através da via subcutânea (nas áreas de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta) usando-se agulhas de calibre e comprimento apropriados. Não deve ser injetado mais de 10 mL em um mesmo local.

Suínos:

Em leitões com até 10 kg de peso, administrar 1 mL por via subcutânea em apenas um local.

Animais pesando mais de 10 kg, aplicar 1 mL para cada 10 kg de peso e com mais de 100 kg, recomenda-se dividir a dose em dois locais de aplicação.

Ovinos/Caprinos:

Administrar 1 mL para cada 10 kg de peso por via intramuscular. Em animais com mais de 50 kg de peso, recomenda-se dividir a dose em dois locais de aplicação.

Terramicina[®]/LA Solução Injetável

Aves/Coelhos:

Administrar dose única 0,25 mL para cada kg de peso correspondente a 50 mg/kg.

Observações:

Normalmente, uma simples dose será suficiente para um tratamento eficaz. Entretanto, em infecções severas, há necessidade de uma segunda dose, três a cinco dias após a aplicação inicial.

“A subdosagem interfere na eficácia do tratamento”.

“A Terramicina[®]/LA Solução Injetável pode ser tornar escura com o tempo, porém sua atividade permanece inalterada”.

As dosagens podem ser alteradas à critério do médico veterinário.

Precauções e período de retirada:

- O leite de vacas em tratamento e nas 96 horas seguintes ao tratamento, não deve ser usado para consumo humano.
- Suspender a medicação 28 dias antes do abate dos animais para consumo humano.
- Não administrar em aves produtoras de ovos para consumo humano.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 0801 em 29/11/78.

Apresentação: Frasco ampola de vidro contendo 10, 20, 40, 50, 100 e 250 mL.