

TopTag* 40

Uso Veterinário

Inseticida pronto para uso, destinado ao controle da mosca do chifre.

Fórmula:

Cada brinco de 15 g contém:

Diazinon 6,0g

Excipiente q.s.p..... 15,0g

Indicações:

O brinco TopTag* 40 é indicado no controle das infestações da mosca do chifre (*Haematobia irritans*) em bovinos , incluindo aquelas cepas resistentes ao tratamento com inseticidas piretróides. Aplicado conforme recomendação da bula, confere um período de proteção de 150 dias contra infestações da mosca do chifre.

Modo de usar:

Aplicar um brinco em cada orelha, com auxílio de um alicate aplicador apropriado, durante os meses mais favoráveis ao aparecimento das moscas.

A aplicação deve ser feita na porção mediana da orelha, na sua face externa, tomando cuidado especial para que o pino não atinja cartilagem ou vasos sanguíneos a fim de evitar danos à mesma. O Diazinon transmigra paulatinamente da matriz de poliuretano e vai aos poucos se acumulando sobre o pêlo do animal, onde forma uma camada fatal para as moscas que venham a pousar sobre o animal.

A aplicação deve ser feita conforme abaixo descrito:

- Desinfetar o alicate antes do uso. Com o dedo polegar, pressionar a alavanca de pressão do alicate e introduzir o brinco. O “colarinho” do brinco deve ser colocado voltado para baixo.
- Introduzir o pino do brinco na ponteira do alicate até o ponto em que parte dela se projete para fora. Alinhar a ponta do macho com o furo da fêmea do brinco. O brinco e o contrapino estão prontos para aplicação.
- Posicionar o brinco na superfície plana e no centro da face posterior da orelha. Evitar que o contrapino atinja cartilagem ou vasos sanguíneos para evitar danos à orelha.

TopTag* 40

Importante:

Os brincos TopTag* 40 devem ser retirados 150 dias após a aplicação, cortando-se o pino fixador (macho) com uma tesoura ou alicate. Nesse momento, havendo ainda condições propícias a novas infestações, um novo brinco deve ser colocado, aproveitando-se a perfuração já existente na orelha.

Precauções:

- O produto deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, em local seco e fresco, em temperatura inferior a 35 °C.
- Não usar o produto fora do prazo de validade.
- Não manusear o produto com as mãos desprotegidas (usar luvas).
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Após o uso antes de beber, comer ou fumar, lavar as mãos e o rosto com água em abundância.
- De forma segura, descartar as embalagens vazias, evitando a contaminação do meio ambiente.
- Não contaminar lagos, fontes, rios e demais coleções de água, lavando as embalagens do produto ou lançado-lhes seus restos.
- Não fazer tratamentos simultâneos com outros organofosforados.

Advertências:

- Conservar a embalagem fora do alcance de crianças, de pessoas desprotegidas e de animais domésticos.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, ração animal, medicamentos, produtos domésticos e de higiene.
- Não utilizar a embalagem vazia.

Cuidados no manuseio do produto:

- Evitar contato com a pele e olhos.
- Usar luvas protetoras para aplicação dos brincos.
- Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente.
- No caso de intoxicação humana, chamar imediatamente um médico.

Antídoto:

TopTag* 40

Sulfato de Atropina, combinado com reativadores da colinesterase, como Contrathion e PAM.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.251/2002 em 30/04/2002.

Apresentação: Caixa de papelão contendo 2 sachês aluminizados, com 10 brincos, cada.