

# LincoSpectin Premix

período de  
retirada  
**ZERO**

A primeira opção no combate  
aos problemas entéricos dos suínos

Eficaz contra os principais  
agentes das diarreias

*Salmonella spp.*

*E. coli*

*Brachyspira spp.*

*Lawsonia intracellularis*

Período de retirada zero



# LincoSpectin Premix



## Composição

Lincomicina (cloridrato de lincomicina).....22 g  
Espectinomicina (sulfato de espectinomicina)....22 g  
Excipiente q.s.p.....1000 g

## Indicações

- Prevenção, controle e tratamento da ileíte (*Lawsonia intracellularis*).
- Prevenção, controle e tratamento da colite suína e disenteria suína (*Brachyspira spp.*).
- Prevenção, controle e tratamento da colibacilose e doença do edema (*E. coli*).
- Prevenção, controle e tratamento da salmonelose (*Salmonella spp.*).

## Observações

- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Mantenha em local fresco e seco.

## Número de registro

(Ministério da Agricultura) 0005 - 20/08/1975.

**Período de retirada** - 0 dias.

**Apresentação** - sacos de 25 kg.

**Validade** - 24 meses.


## Posologia

- Na prevenção e controle da ileíte, disenteria suína e colite, use 1,0 kg do produto por tonelada de ração (44 ppm de droga atividade) durante 3 semanas.
- No tratamento da ileíte, disenteria suína e colite, use 2,0 kg de produto por tonelada de ração (88 ppm de droga atividade) durante 3 semanas.
- No controle e tratamento da colibacilose, doença do edema e salmonelose, use 2,0 a 2,5 kg do produto por tonelada de ração (88 a 110 ppm de droga atividade) durante 3 semanas.

## Tabela de uso

Doença	Dose ppm	Qtde (kg/ton ração)
Colite suína	44 a 88	1,0 a 2,0
Ileíte	44 a 88	1,0 a 2,0
Disenteria suína	44 a 88	1,0 a 2,0
Colibacilose/doença do edema	88 a 110	2,0 a 2,5
Salmonelose	88 a 110	2,0 a 2,5

## Esquema de uso



(\*) Esquema demonstrando a dosagem mais usual por fase. Não significa a recomendação do uso contínuo do produto.

Consulte sempre um médico veterinário.