

Suramox Premix 50%

A única amoxicilina revestida do mercado (pelo processo Stavibac®)

Eficácia muito superior aos produtos à base de amoxicilina padrão (sem revestimento)



Suramox Premix 50%



Composição

Amoxicilina trihidratada.....50 g
Excipiente q.s.p.....100 g

Indicação

- Controle, prevenção e tratamento de encefalite estreptocócica (*Streptococcus suis* tipo II).
- Controle, prevenção e tratamento de doença de Glässer (*Haemophilus parasuis*).
- Controle, prevenção e tratamento de pleuropneumonia (*Actinobacillus pleuropneumoniae*).
- Controle, prevenção e tratamento da epidermite exsudativa (*Staphylococcus hyicus*).

Observações

- Mantenha em local fresco e seco.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Número de registro

(Ministério da Agricultura) 4736 - 15/07/1994.

Período de retirada - 15 dias.

Apresentação - barricas com 5 kg.

Validade - 24 meses.


Posologias

- Para prevenção e controle, use 400 g de Suramox 50% por tonelada de ração durante 1 a 2 semanas.
- Para tratamento, use de 600 a 800 g de Suramox 50% por tonelada de ração durante 1 a 2 semanas.

Tabela de uso

Posologia	Dose ppm	Qtde (g/ton ração)
Prevenção e controle	200 ppm	400
Tratamento	300 a 400 ppm	600 a 800

Esquema de uso para prevenção e controle



(*) Pulso estratégico para prevenção e controle de encefalite na fase de creche. O pulso deve ser usado uma a duas semanas antes do início dos casos clínicos.

(**) Em determinadas situações pode ser necessário o uso de pulso estratégico para prevenção e controle na fase de crescimento/terminação. Nestes casos o pulso deve ser usado uma a duas semanas antes do início dos casos clínicos.

Consulte sempre um médico veterinário.