

A-D-E Injetável Emulsificável Pfizer

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Vitamina A	25.000.000 UI
Vitamina D ₃	7.000.000 UI
Vitamina E	7.000 UI
Veículo q.s.p.	100 mL

Descrição:

A-D-E Injetável Emulsificável Pfizer é um produto estéril e pronto para uso. Contém as Vitaminas A, D₃ e E em quantidades equilibradas, capazes de atender as exigências orgânicas dos animais, constituindo, pois, eficaz tratamento quer curativo, quer profilático, nas hipovitaminoses A, D e E. O produto com ação emulsificante contribui para melhorar, acelerar e potencializar a absorção das vitaminas A, D e E proporcionando um considerável aumento nas suas reservas hepáticas e disponibilidade orgânica.

Indicações:

A-D-E Injetável Emulsificável Pfizer é indicado como fonte de vitaminas A, D e E para bovinos, eqüinos, suínos, caprinos e coelhos. Recomenda-se o uso do produto nos seguintes casos:

- Prevenir doenças carenciais de vitaminas A-D-E.
- Suprir as reservas vitamínicas em fases difíceis do ano.
- Aumentar a resistência às infecções.
- Auxiliar no tratamento de doenças infecciosas.

Modo de uso e dosagens:

A-D-E Injetável Emulsificável Pfizer é indicado por via intramuscular ou subcutânea, nas seguintes doses:

Bovinos e eqüinos:

Animais jovens: 1mL para cada 50 Kg de peso, cada 45 dias.

Recria e engorda: 5 mL/cabeça, cada 120 dias.

Animais em confinamento, reprodução, gestação ou lactação: 5 mL/cabeça, cada 75 dias.

A-D-E Injetável Emulsificável Pfizer

Suínos:

Leitões até 3 meses: 0,5 mL/cabeça.

Recria: 1 mL/cabeça, cada 75 dias.

Porcas em gestação e reprodutores: 3 mL/cabeça, cada 75 dias.

Ovinos e caprinos:

Animais jovens: 0,5 mL/cabeça.

Reprodutores: 2 mL/cabeça, cada 75 dias.

Coelhos: Reprodução: 0,5 mL/cabeça, cada 75 dias.

Atenção: Não se recomenda o uso em cães e gatos.

Precaução: Deve-se observar que em determinadas regiões, podem ocorrer casos raros de animais que em seguida à aplicação de medicamentos injetáveis contendo vitaminas, podem apresentar reações de hipersensibilidade individuais (hipersalivação, incoordenação dos movimentos, edema das mucosas ocular e vaginal), que podem desaparecer espontaneamente em alguns minutos. Quando se tratar de animais hipersensíveis, recomendamos aplicar, via intramuscular ou endovenosa, produtos anti-histamínicos (Prometazina 100 a 150 mg, ou Fenegan, 2 a 3 ampolas de 2 mL), e ainda corticosteróides, nas dosagens recomendadas pelo fabricante.

Cuidados: Limpar e desinfetar a seringa, a agulha e o local da aplicação.

Conservar em ambiente seco e fresco, uma vez em uso, guardar o frasco em refrigeração.

Agitar antes de usar.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

VENDA E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n.º 0113/72 em 29/05/72.

Apresentação: Frascos contendo 10, 20, 50, 100, 250 e 500 mL.