

Biocid[®]

Desinfetante, bactericida, viricida,
Fungicida e esporicida.
Detergente e removedor de gorduras

Uso Veterinário

Composição:

Cada litro contém: Iodophor 1.000 mL. Contém 2,6% de iodo

Indicações e modo de usar:

Biocid[®] deve ser diluído em água para pulverização ou lavagem como descrito a seguir:

Diluição 1:250 (1 litro para 250 litros de água):

Lavagem e desinfecção de mãos e úberes. Uso em pedilúvios, devendo-se trocar a solução cada 24 horas.

Diluição 1:320 (1 litro para 320 litros de água):

Desinfecção contra o vírus da Febre Aftosa: pulverização de galpões, estábulos, vagões, veículos de transporte de gado, lavagem de equipamentos, lavagem de instalações.

Diluição 1:500 (1 litro para 500 litros de água):

Lavagem e desinfecção de aviários, gaiolas, incubadoras, pocilgas, maternidades, estábulos, cocheiras, coelheiras, canis, jaulas. Lavagem e desinfecção de equipamentos em geral: baldes, bandejas, bebedouros, comedouros, etc.

Lavagem e desinfecção de instalações de haras, jockey-clubs, hípicas e jardins zoológicos. Lavagem e desinfecção de instrumentos cirúrgicos.

Diluição 1:1.200 (1 litro para 1.200 litros de água):

Em matadouros: lavagem e desinfecção de instalações e equipamentos. Em laticínios: lavagem e desinfecção de ordenhadeiras, latões e tanques. Lavagem e desinfecção de hospitais veterinários.

Diluição 1:2.000 (1 litro para 2.000 litros de água):

Desinfecção de água de bebida dos animais.

Biocid[®] apresenta ação bactericida após 30 segundos contra **Estafilococos** (inclusive **S. aureus**), **Streptococos**, **Salmonelas**, **Clostrídios**, **Pseudomonas**, **Corynebacterium**, **Escherichia coli**, **Mycobacterium tuberculosis**, **Bacillus anthracis**, **Malleomyces mallei**, **Sphaeraphorus necrophorus**, **Hemophilus**, **Shigelas**. Biocid[®] apresenta ação fungicida após 30 segundos contra fungos dos gêneros **Microsporum**, **Epidermophitum**, **Trichophytum**, **Aspergillus**, **Candida**, **Penicillium**, **Actinomyces**.

Biocid[®]

Desinfetante, bactericida, viricida,
Fungicida e esporicida.
Detergente e removedor de gorduras

Biocid[®] apresenta ação viricida após 15 segundos contra o vírus da febre aftosa. Biocid[®] também age contra os vírus causadores das seguintes doenças: Boubas das aves, Doença de Newcastle, Doença de Gumboro, Bronquite Infecciosa, Laringotraqueíte Infecciosa, Hepatite Infecciosa, Encefalomielite aviária.

Observações:

- Quando utilizado nas dosagens recomendadas, Biocid[®] não é tóxico, corrosivo ou irritante para a pele e mucosas.
- A descoloração de Biocid[®] na água é o indicador de perda de atividade germicida da solução e mostra quando a solução deve ser trocada por outra.
- A eficácia germicida dos desinfetantes é gradativamente diminuída quanto mais elevada for a quantidade de material orgânico presente (sangue, pus, fezes, secreções, etc). Recomenda-se portanto uma lavagem para retirada desse material orgânico, quando em excesso, para permitir um contato melhor e mais eficaz do produto com os microrganismos.

Precauções:

Biocid[®] puro pode causar irritação, alergias ou queimaduras. Evite o contato direto, porém se isso ocorrer, lave o local com bastante água corrente limpa. Se houver irritação persistente procure o médico levando a embalagem do produto.

Manter fora do alcance de crianças.

Informação para uso médico:

O produto contém iodo em veículo ácido.

Se acidentalmente ingerido, administrar leite de magnésia (200 mL ou mais) e água ou leite em quantidade para neutralizar e diluir o ácido. Não provocar vômito. Para o iodo, o antídoto é a tiosulfato de sódio: 100 mL a 5% por via oral.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 30 em 09/02/71

AUP SIF/DIPOA nº 1728/2002.

Apresentação: Frascos com 1, 10 e 20 litros.