

# Formoped<sup>®</sup>

## **Uso Veterinário**

### **Indicações:**

Podridão dos pés (foot rot, Piétin) dos ovinos. Podridão dos cascos dos bovinos (foot rot). Frieiras em geral. Lesões necróticas dos pés. Papilomatose bovina (figueira).

### **Fórmula:**

Cada 100 mL contém:

M.M.D.H. (Monometilol dimetil hidantoína)..... 27,5 g

Veículo q.s.p..... 100,0 mL

Propelente: Butano

### **Recomendações para o uso:**

Aplicar Formoped<sup>®</sup> cobrindo toda a área afetada. Repetir o tratamento quando necessário. Nos casos de papilomatose bovina (figueira), fazer aplicações diárias nas verrugas maiores, durante 10 dias. Pode ser associada ao tratamento, com produto à base de Terramicina. Manter fora do alcance de crianças. Não contém clorofluorcarbono.

### **Informações para uso médico:**

**O princípio ativo ao entrar em contato com a pele e outros tecidos desprende formalina, podendo ser tóxico, causar queimaduras e alergias em seres humanos.**

### **Precauções:**

Não aspirar e não pulverizar o produto nos olhos ou na pele. Caso isso ocorra, lavar os olhos com água e a pele com água e sabão. Se houver irritação ou ardor local, procure o médico, **levando a embalagem do produto**. Conteúdo sob pressão, não fure nem incinere o tubo, mesmo vazio. Produto inflamável. Não usar ou guardar em lugar quente, próximo a chamas ou exposto ao sol.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n.º 2501/63 em 16/08/63.

**Apresentação:** Tubo com 400 mL. Peso líquido 188 gramas.