

Terramicina® Pó Solúvel com Antigerm 77

Uso Veterinário

Para o tratamento das infecções bacterianas de Frangos de Corte, Poedeiras, Perus, Bovinos, Suínos, Coelhos, Ovinos, Caprinos e Abelhas.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

| | |
|--|---------|
| Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina)..... | 5,5 g |
| Antigerm 77 (cloreto de benzetônio)..... | 5,5 g |
| Veículo q.s.p..... | 100,0 g |

Indicações:

Para o tratamento de diarréias (cursos), enterites, cólera aviária, tifo aviário, pulorose, doenças respiratórias (pneumonia, bronquites, coriza infecciosa) causadas por:

Escherichia coli, *Salmonella* spp, *Haemophilus gallinarum*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* sensíveis a oxitetraciclina.

Dosagens e modo de uso:

Pintos, peruzinhos, frangos, galinhas e perus: 1 medida (5g) para cada 5 litros de água durante 5 dias consecutivos.

Bovinos: 2 – 3 medidas (10 - 15g) para cada 60 kg de peso vivo, durante 5 dias consecutivos.

Suínos e coelhos: 2 – 3 medidas (10 – 15g) dissolvidas em água, durante 5 dias consecutivos.

Ovinos e caprinos: 1 – 2 medidas (5 – 10g) para cada 20 kg de peso vivo, durante 5 dias consecutivos.

Abelhas: dissolver 1 medida (5 g) em 250 mL de água ou xarope (300g de açúcar em 1 litro de água) e pulverizar as colméias.

Observações:

1. O produto pode ser administrado, dissolvido na água de bebida, leite ou diretamente na boca do animal.
2. As dosagens podem ser modificadas a critério do médico veterinário.

Terramicina® Pó Solúvel com Antigerm 77

3. Não interromper o tratamento antes de cinco dias, mesmo que antes disto haja desaparecimento dos sintomas.
4. A água medicada deve ser fornecida em abundância para todos os animais em tratamento, durante 24 horas por dia. Nenhuma outra fonte de água, que não a medicada deve ficar disponível durante todo o período de tratamento.
5. Suspender o uso do medicamento, cinco dias antes do abate. Não consumir o leite ou ovos dos animais tratados, antes de decorridos 05 dias do fim da última medicação.
6. Preparar soluções novas de medicação diariamente, descartando as sobras anteriores.
7. Caso o conteúdo não seja utilizado de uma só vez, feche bem a embalagem, para evitar entrada de umidade.

Acompanha esta embalagem uma medida de 5 gramas.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n.º 1486/59 em 10/07/59.

Apresentação: Sachês aluminizados contendo 100g ou fibrolatas contendo 1.000g do produto.