

# Valbazen® 10 Cobalto

## Anti-helmíntico de largo espectro

### Uso Veterinário

#### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Albendazole ..... 10,00 g  
Sulfato de cobalto ..... 1,35 g  
Veículo apropriado ... q.s.p. .... 100,00 mL

#### Indicações:

Controle e tratamento de endoparasitoses dos bovinos e ovinos causadas por nematódeos gastrintestinais e pulmonares, cestódeos e formas adultas de trematódeos.

#### Dosagem:

- Tratamento de cestódeos, nematódeos gastrintestinais e pulmonares: 5,0 mg de Albendazole e 0,675 mg de sulfato de cobalto/kg de peso (1 mL de Valbazen® 10 Cobalto/20 kg).
- Tratamento de trematódeos (*Fasciola hepática*): 10 mg de Albendazole e 1,350 mg de sulfato de cobalto/kg de peso (2 mL de Valbazen® 10 Cobalto /20 kg).
- Tratamento de larvas inibidas de *Ostertagia*: 7,5 mg de Albendazole e 1,012 mg de sulfato de cobalto/kg de peso (1,5 mL de Valbazen® 10 Cobalto / 20kg).

A tabela a seguir pode ser usada como indicador de dosagens:

Kg de peso a ser tratado	Cestódeos,nematódeos gastrintestinais e pulmonares (dose em mL)	Trematódeos (dose em mL)	Larvas inibidas <i>Ostertagia</i> (dose em mL)
Até 20	1	2	1,5
21 – 40	2	4	3,0
41 – 60	3	6	4,5
61 – 80	4	8	6,0
81 – 100	5	10	7,5
101 – 120	6	12	9,0
121 – 140	7	14	10,5
141 - 160	8	16	12,0

#### Instruções de uso:

- Agitar bem antes de usar.
- Administrar por via oral, com pistola dosificadora adequada.

Valbazen® 10 Cobalto  
Anti-helmíntico de largo espectro

**Precauções:**

- Período de carência: carne 14 dias.
- Não administrar o produto em fêmeas prenhes, nos primeiros 45 dias de gestação.
- Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 2.220/85 em 14/05/85.

**Apresentação:** Embalagens individuais: 100 mL, 1 e 5 litros.