

Equitac[®]

Anti-helmíntico de largo espectro para eqüídeos

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 1,0 g contém:

Oxibendazole 0,227 g

Excipiente para pasta q.s.p 1,0 g

Indicações:

Controle e tratamento da verminose gastrintestinal dos eqüínos, muares e asininos. Além de eliminar os vermes adultos, o produto é também ovcida e larvicida.

Não apresenta contra-indicações, podendo ser administrado a animais de qualquer idade e a fêmeas gestantes.

Não exige jejum prévio.

Instruções para uso:

- Observar a graduação existente no êmbolo da seringa.
- Girar o anel, ajustando-o no êmbolo de acordo com o peso do animal a ser tratado.
- Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal e pressionar o êmbolo até o anel.
- Recomenda-se desparasitar os animais adultos a cada 8 semanas e os jovens, a cada 4 semanas.

Tabela de dosificação:

Administrar 10 mg por kg de peso:

Peso (kg)	Produto (g)
Até 50	2,2
51 – 100	4,4
101 – 200	8,8
201 – 300	13,2
301 – 400	17,6
401 – 500	22,0

Venda sob prescrição, aplicação e orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n.º 1500 em 28/01/82.

Equitac[®]

Anti-helmíntico de largo espectro para eqüídeos

Apresentação: Seringa plástica descartável com 22g, disponíveis em cartuchos contendo 10 e 20 unidades.