

Equitac® Plus

Anti-helmítico de largo espectro para eqüídeos

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 100g contém:

Oxibendazole micronizado	16,667g
Triclorfon	37,540g
Excipiente q.s.p.	100,000g

Indicações:

Controle de endoparasitoses dos eqüídeos, causadas pelos seguintes nematódeos gastrintestinais: *Strongylus vulgaris*, *S. eqüinos*, *S. edentatus*, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Strongyloides westeri*, *Habronema* sp e pequenos estrôngilos (inclusive algumas cepas resistentes a outros benzimidazóis).

Eficaz também sobre as formas larvares de *Gasterophilus intestinalis* e *G. nasalis*.

Modo de usar:

Observar a graduação existente no êmbolo da seringa. Girar o anel, ajustando o êmbolo de acordo com a dose a ser administrada ao animal. Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal de tal forma que o bico atinja a superfície da língua e pressionar o êmbolo até o anel. A pasta deve ficar aderida à língua do animal.

Dosagens:

Administrar 10 mg/kg de peso vivo de oxibendazole e 22,5 mg/kg de peso de triclorfon, ou seja, 3,00g de pasta para cada 50 kg de peso.

Precauções:

- Não administrar o produto simultaneamente com anestésicos e outros inibidores da colinesterase.

Cloridrato de succinil e derivados da fenotiazina não devem ser usados nos 10 dias anteriores e posteriores ao tratamento.

- Não tratar animais caquéticos, com diarréia, ou infecções graves, fêmeas no último mês de gestação, potros com menos de 4 meses de idade, e ainda animais cansados após treinos, corridas e trabalho.

- Não utilizar os animais nas 8 horas seguintes ao tratamento.

Equitac[®] Plus

Anti-helmítico de largo espectro para eqüídeos

- Não repetir o tratamento antes de um intervalo de 3 semanas.
- Conservar o produto em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Recomendações ao cliente:

Por se tratar de produto com fosforado na formulação (cuidado, veneno), os seguintes cuidados devem ser tomados ao manusear o produto: não reaproveitar a embalagem vazia; não guardar o produto junto a bebidas, alimentos e produtos de higiene e domésticos; não fumar, beber ou ingerir alimentos durante a aplicação do produto; lavar as mãos com água e sabão em abundância após o uso do produto.

Antídoto: Triclorfon é um organofosforado. Eventuais intoxicações devem ser tratadas com atropina e ou reativadores da colinesterase (PAM, CONTRATHION).

Venda sob prescrição, aplicação e orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 1.753 em 19/08/83.

Apresentação: Seringa plástica descartável, graduada, contendo 30g