

Excenel[®]

Uso Veterinário

Fórmula:

Frasco de 1g com diluente de 20 mL: Cada 20 mL contém:	Ceftiofur sódico..... 1g
	Veículo q.s.p..... 20 mL
Frasco de 1g com diluente de 80 mL: Cada 80 mL contém:	Ceftiofur sódico..... 1g
	Veículo q.s.p..... 80 mL
Frasco de 4g com diluente de 80 mL: Cada 80 mL contém:	Ceftiofur sódico..... 4g
	Veículo q.s.p..... 80 mL

Excenel[®] contém o sal sódico de ceftiofur, um antibiótico com largo espectro de ação, pertencente ao grupo das cefalosporinas. É ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. Como outras cefalosporinas, ceftiofur é bactericida *in vitro*, interferindo na síntese da parede bacteriana.

Indicações:

Bovinos:

Tratamento de pneumonias e febre do transporte (*Pasteurella haemolytica*, *P. multocida*, *Haemophilus somnus*) e enterites (*Salmonella* spp).

Suínos:

Tratamento e controle da doença respiratória bacteriana (pleuropneumonia e pneumonia bacteriana suína) associada a *Actinobacillus* (*Haemophilus*) *pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, enterites (*Salmonella choleraesuis*), meningoencefalite (*Streptococcus suis* tipo 2) e infecções geniturinárias.

Aves:

Controle da mortalidade na primeira semana, associada a *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus* susceptíveis ao ceftiofur.

Eqüinos:

Tratamento de infecções respiratórias bacterianas associadas a *Streptococcus zooepidemicus*, *Streptococcus equi*, *Pasteurella* spp, *Staphylococcus* spp e *Escherichia coli*.

Cães:

Tratamento de infecções urinárias associadas a *Escherichia coli* e *Proteus mirabilis*.

Doses e modo de usar:

Excenel[®]

Retirar o diluente com uma seringa estéril. Injetar o conteúdo total do diluente no frasco com o pó estéril e agitar.

Para o frasco de 1g com diluente de 80 mL, injetar apenas 20 mL do diluente no frasco com o pó estéril e agitar. Retornar a solução ao frasco com diluente.

Posologia

Administrar na dose de 1 – 3 mg de ceftiofur / kg de peso, ou a critério do médico veterinário. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por 3 dias consecutivos. Administrar por via intramuscular em bovinos, suínos e eqüinos, por via intramuscular ou subcutânea em aves e por via subcutânea em cães.

Bovinos: (1 mg/kg de peso corporal)

Frasco de 1g com 20 mL ou frasco de 4g com 80 mL: 1 mL da solução reconstituída (50 mg de ceftiofur) para cada 50 kg de peso corporal.

Frasco de 1g com 80 mL: 2 mL da solução reconstituída (25 mg de ceftiofur) para cada 25 kg de peso corporal.

Fazer uma aplicação a cada 24 horas, durante 3 dias consecutivos.

Suínos:

Suínos pós-desmame (1 mg/kg de peso corporal)

Frasco de 1g com 20 mL ou frasco de 4g com 80 mL: 1 mL da solução reconstituída (50 mg de ceftiofur) para cada 50 kg de peso corporal. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por 3 dias consecutivos.

Suínos em aleitamento (2 mg/kg de peso corporal)

Frasco de 1g com 80 mL: 1 mL da solução reconstituída (12,5 mg de ceftiofur) para cada 6 kg de peso corporal. O programa de aplicação será a critério do médico veterinário.

As dosagens e o tempo de tratamento podem ser modificados de acordo com a gravidade do caso (temperatura, frequência respiratória, etc.) ou recomendação do médico veterinário.

Aves:

Administrar na dose de 2 mg / kg de peso corporal.

Para pintos de 1 dia: administrar na dose de 0,08 a 0,20 mg/pinto, por injeção subcutânea, na região da nuca.

Excenel[®]

Para frascos de 1g com 20 mL e frascos de 4g com 80 mL: administrar 1 mL da solução reconstituída para cada 625 pintos de 1 dia de vida ou 1,6 mL/1000 pintos.

Eqüinos:

Administrar na dose de 2,0 a 4,0 mg / kg de peso corporal, a cada 24 horas. Deve-se administrar um volume máximo de 10 mL em cada local de injeção. O tratamento deve ser continuado por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Cães:

Administrar por via subcutânea, na dose de 2 mg / kg de peso corporal, a cada 24 horas (para frascos de 1g reconstituídos com 80 mL de diluente: administrar 1 mL da solução reconstituída para cada 6 kg de peso vivo). O tratamento deve ser continuado por 5 a 14 dias, a critério do médico veterinário.

Contra-indicações:

O uso de Excenel[®] é contra-indicado para animais hipersensíveis à droga.

Advertências:

Penicilinas e Cefaslosporinas podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Exposições tópicas a alguns antimicrobianos, inclusive Ceftiofur, podem provocar reações alérgicas moderadas ou graves em alguns indivíduos.

Exposições repetidas ou prolongadas podem induzir à sensibilização. Evitar contato direto do produto com a pele, olhos, boca e roupas.

Pessoas com hipersensibilidade conhecida à penicilina ou cefaslosporinas devem evitar contato com o produto.

Em caso de acidentes oculares, lavar os olhos com bastante água por 15 minutos. Em acidentes tópicos, lavar a pele com água e sabão. Retirar a roupa contaminada. Se ocorrerem reações alérgicas (erupção na pele, urticária, dificuldade respiratória), procurar cuidados médicos.

Precauções:

Ainda não foi estabelecida a segurança de ceftiofur em cães reprodutores ou cadelas gestantes.

Período de carência:

Excenel[®]

Não há necessidade de período de retirada antes do abate ou ordenha, quando utilizado nas dosagens recomendadas.

Conservar o produto sob refrigeração entre 2 °C e 8 °C e fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Após sua reconstituição, o produto deverá ser mantido por 7 dias à temperatura de 4 °C ou por 12 horas até 30 °C. Quando congelado o produto reconstituído poderá ser mantido por 8 semanas.

Recomenda-se apenas um descongelamento.

Venda sob prescrição, orientação e aplicação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 3.982 em 28/04/92.

Apresentação: Excenel[®] é disponível em frasco com 1 g de ceftiofur sódico acompanhado de frasco com 20 mL ou 80 mL de diluente e frasco com 4g de ceftiofur sódico acompanhado de frasco com 80 mL de diluente.