

Hylartil Vet

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada seringa de 2 mL contém:

Hialuronato de Sódio	20 mg
Veículo q.s.p.	2 mL

Indicações, administração e modo de usar:

Eqüinos:

Indicado para o tratamento intra-articular de doenças inflamatórias não-infecciosas das articulações em eqüinos. Para o tratamento de lesões de tendão (tendinites) induzidas por exercício em eqüinos.

Cães:

Indicado para o tratamento intra-articular de doenças inflamatórias não-infecciosas das articulações em cães.

Dosagens:

Uso intra-articular:

A dosagem é relativa ao tamanho da articulação. Articulações pequenas e médias em eqüinos devem ser tratadas com doses de 2 mL de Hylartil. Articulações grandes em eqüinos (coxo-femural) devem ser tratadas com 4 mL de Hylartil. Articulações em cães devem ser tratadas com doses de 0,2 a 1,0 mL de Hylartil.

Uso intratendinoso:

Administrar 2 mL no centro da lesão. Se a lesão envolver mais que 10 cm de comprimento do tendão, a dose pode ser dobrada e administrada em 2 aplicações de 2 mL para garantir uniformidade da distribuição na lesão.

Precauções:

Hylartil Vet

Apesar de raras, as reações locais têm sido relatadas em eqüinos, após administração intra-articular de Hialuronato. As reações são tipicamente brandas e usualmente desaparecem em 24-48 horas. Doses repetidas e tratamento conjunto de várias articulações no mesmo animal parecem aumentar o risco de reações indesejáveis.

Conservar sob refrigeração, entre 2°C e 8°C, protegido da luz e congelamento.

Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.858 em 05/07/2001.

Apresentação: Cartucho contendo 1 seringa com 2 mL (10 mg/mL).