

# Clinafarm<sup>®</sup> Smoke

## **Uso Veterinário**

Desinfetante fungicida a base de Enilconazole.

### **Fórmula:**

Cada gerador de fumaça (33,4 g) contém:

Enilconazole .....	5,0 g
Excipiente q.s.p.....	33,4 g

### **Propriedades:**

Clinafarm<sup>®</sup> Smoke contém Enilconazole, um produto fungicida. Pode ser utilizado para a desinfecção de incubadoras e nascedouros, instalações de criações de coelhos e estábulos, bem como outros ambientes e materiais sujeitos a infecções por *Aspergillus fumigatus* ou outros fungos, tais como dermatófitos.

### **Modo de usar:**

Para usar Clinafarm<sup>®</sup> Smoke, retirar a tampa e em seguida acender a mecha. Um gerador é suficiente para 50 m<sup>3</sup> de ambiente.

### **Em incubatórios:**

- a) Em locais infectados por *Aspergillus*, podendo resultar em aspergilose clínica nos animais expostos, todas as instalações devem ser desinfetadas:
  - **Incubadoras:** desinfetar paredes e portas com solução antifúngica antes do carregamento dos ovos.
  - **Nascedouros:** desinfetar paredes e portas com solução antifúngica antes da transferência e acender 1 gerador de Clinafarm<sup>®</sup> Smoke por compartimento na noite anterior à coleta.
- b) Para prevenção de infecção por *Aspergillus*.
  - **Incubadoras e nascedouros :** acender 1 gerador de Clinafarm<sup>®</sup> Smoke por compartimento na noite anterior à coleta. Um gerador é suficiente para 50 m<sup>3</sup> de ambiente.

**Para outras salas, estábulos, galpões e materiais onde pode ser observada uma contaminação fúngica:**

## Clinafarm<sup>®</sup> Smoke

- Em ambientes que podem ser convenientemente fechados ou em locais onde o uso de nebulização não é adequado por razões práticas (ex.: laboratórios biológicos), recomenda-se a queima de 1 gerador de Clinafarm<sup>®</sup> Smoke para cada 50 m<sup>3</sup>. A repetição do tratamento depende do risco de reinfecção.

### **Observações:**

- Clinafarm<sup>®</sup> Smoke é inflamável, não é corrosivo e pode ser combinado a outros desinfetantes, como o formol.
- Como em qualquer desinfecção, é necessário realizar previamente uma rigorosa limpeza, com remoção da matéria orgânica.
- Após nebulização ou fumigação, recomenda-se que as salas, incubadoras ou nascedouros sejam mantidos totalmente fechados durante o maior espaço de tempo possível.
- Em caso de infecções recorrentes por dermatófitos devido à infecção ambiental, recomenda-se desinfetar o ambiente com Clinafarm<sup>®</sup> Smoke, além do tratamento terapêutico dos animais.

### **Precauções:**

Evitar o contato do produto com alimentos e bebidas, como também sua inalação e contato com a pele. Não comer ou fumar durante a desinfecção. Após a operação, lavar as mãos cuidadosamente.

Conservar em temperatura abaixo de 25 °C e fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Não usar como produto domissanitário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 4.529 em 04/01/94.

**Apresentação:** Gerador de fumaça (33,4 g) acondicionado em caixa com 6 unidades.