

Excenel[®] RTU

(Suspensão estéril de cloridrato de ceftiofur)

Uso Veterinário

Para uso subcutâneo ou intramuscular em bovinos e uso intramuscular em suínos.

Excenel[®] RTU é uma formulação pronta para uso que contém sal cloridrato de ceftiofur, antibiótico cefalosporínico de amplo espectro, ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. Como outras cefalosporinas, Ceftiofur é bactericida *in vitro*, interferindo na síntese da parede celular das bactérias suscetíveis.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de ceftiofur micronizado..... 5,0 g

Veículo q.s.p..... 100 mL

Indicações:

Bovinos:

Tratamento de pneumonias e febre do transporte associadas a *Pasteurella Haemolytica*, *P. multocida* e *Haemophilus sommus*, enterites (*Salmonella* spp e *Escherichia coli*), podridão nos cascos (*Fusobacterium necrophorum* e *Bacteróides melaninogenicus*) e infecções geniturinárias.

Suínos:

Tratamento e controle da doença respiratória bacteriana (pneumonia bacteriana suína) associada a *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, enterites (*Salmonella choleraesuis*), meningoencefalite (*Streptococcus suis* tipo 2) e infecções geniturinárias.

Doses e modo de usar:

Bovinos: 1 mL / 50 kg

Administrar na dose de 1 mg de Ceftiofur / kg de peso, pela via subcutânea ou intramuscular. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por três dias consecutivos.

Suínos:

Administrar na dose de 1 a 3 mg de Ceftiofur / kg de peso, somente pela via intramuscular. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por três consecutivos.

Excenel[®] RTU

(Suspensão estéril de cloridrato de ceftiofur)

Agitar bem antes de usar. Não havendo alteração do quadro clínico, retornar ao veterinário para revisão do diagnóstico.

Contra-indicações:

O uso de Excenel[®] RTU é contra-indicado para animais hipersensíveis à droga.

Advertências:

Penicilinas e Cefalosporinas podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Exposições tópicas a alguns antimicrobianos, inclusive Ceftiofur, podem provocar reações alérgicas moderadas ou graves em alguns indivíduos.

Exposições repetidas ou prolongadas podem induzir à sensibilização.

Evitar contato direto do produto com a pele, olhos, boca e roupas.

Pessoas com hipersensibilidade conhecida à penicilina ou cefalosporinas devem evitar contato com o produto.

Em caso de acidentes oculares, lavar os olhos com bastante água por 15 minutos. Em acidentes tópicos, lavar a pele com água e sabão. Retirar a roupa contaminada. Se ocorrer reações alérgicas (erupção na pele, urticária, dificuldade respiratória), procurar cuidados médicos.

Período de carência:

Não exige descarte de leite e nem a retirada do medicamento antes do abate, quando utilizado nas dosagens recomendadas.

Precauções:

Áreas de descoloração associadas ao local da injeção no período inferior ou igual a 11 dias podem resultar em extirpação da região afetada no abate.

Mantenha fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 5.761 em 09/12/96.

Apresentação: Frasco-ampola de vidro contendo 10 mL ou 100 mL.