

Kaobiotic[®] Suspensão

Uso Veterinário

Tratamento das diarreias bacterianas e enterites em animais de grande e pequeno porte, produzidas pelos gêneros *Streptococcus* sp, *Staphylococcus* sp, *Aerobacter* sp, *Pseudomonas* sp, *Shigella* sp, *Clostridium* sp, *Brucella* sp, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris* e *Actinomyces bovis*.

Cada 100 mL contém:

Sulfato de neomicina (equivalente a 153,87 mg de neomicina base) ...	219,92 mg
Sulfaguanidina	6,60 g
Sulfadiazina	0,40 g
Sulfamerazina	0,40 g
Sulfatiazol	0,40 g
Caulim	19,72 g
Pectina	0,44 g
Veículo aromatizado q.s.p.	100,00 mL

Doses diárias recomendadas:

Bovinos e Equinos: de 4 a 8 colheres das de sopa (60 a 120 mL)

Ovinos e Suínos: de ½ a 4 colheres das de sopa (7,5 a 60 mL).

Caninos: de 1 colher das de chá a 2 colheres das de sopa (5 a 30 mL).

Felinos: de ½ a 2 colheres das de chá (2,5 a 5 mL).

Contra-indicações:

Doenças renais e lesões graves do parênquima hepático.

Aviso:

A persistência dos sintomas após 2 a 3 dias de tratamento determinará novas pesquisas sobre a etiologia da enfermidade.

Kaobiotic[®] Suspensão

Conservar em temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Agitar bem antes de usar.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 2.357 em 25/01/1968.

Apresentação: Frasco contendo 250 mL.