

Linco-Spectin® 100

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 100 g do produto contém:

Espectinomicina (na forma de Sulfato de Espectinomicina)	44,50 g
Lincomicina (na forma de Cloridrato de Lincomicina)	22,20 g
Benzoato de Sódio N. F. pó	1,07 g
Lactose Monoidratada N. F. pó ... q.s.p.	100,0 g

Indicações:

Aves:

Prevenção e tratamento de Doença Crônica Respiratória (DCR) causada por *Mycoplasma* spp e Doença Crônica Respiratória Complicada (DCRC) associada com infecções micoplasmáticas e por coliformes suscetíveis à associação de Lincomicina e Espectinomicina.

Perus:

Para uso em perus com até 5 dias de idade, na prevenção e no tratamento de aerosaculite causada por *Mycoplasma meleagridris* suscetível à associação de Lincomicina e Espectinomicina.

Suínos:

Tratamento de disenteria suína causada por *Brachyspira hyodisenteriae*, *Brachyspira pilosicoli*, enterites bacterianas causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp e *Lawsonia intracellularis* (ileíte) e pneumonias e artrite infecciosa causadas por organismos suscetíveis à associação de Lincomicina e Espectinomicina.

Linco-Spectin® 100

Contra-indicações:

Coelhos, “Porquinho-da-Guiné” hamsters, eqüinos e ruminantes não devem ter acesso a alimento que contenha Lincomicina. A ingestão por essas espécies pode resultar em efeitos gastrintestinais severos.

Efeitos colaterais:

Ocasionalmente, os suínos tratados com Lincomicina podem apresentar diarréia e/ou edema do ânus nos primeiros 2 dias de tratamento. Em raras ocasiões, alguns animais podem apresentar vermelhidão na pele e comportamento irritadiço. Estas alterações podem ser autocorrigidas dentro de 5 a 8 dias, sem necessidade de interrupção do tratamento.

Dosagens e modo de usar:

Preparar uma solução limpa e fresca a cada dia.

Dose: 1 frasco do produto para cada 120 litros de água de bebida. Oferecer como única fonte de bebida até o consumo completo.

Aves:

Prevenção de DCR:

Administrar 150 mg de atividade antibiótica (50 mg de Lincomicina + 100 mg de Espectinomicina) por kg de peso vivo por dia, durante os 3 a 5 primeiros dias de vida. Essa quantidade deverá ser dissolvida na água de bebida na proporção de 0,5 g de atividade por 1 litro de água e oferecida como única fonte de bebida até o consumo completo. Após, oferecer água de bebida não medicada pelo restante do dia.

Administrar 50 mg de atividade antibiótica por kg de peso vivo por dia, durante 1 a 2 dias na 4ª semana de idade ou após a vacinação. Essa quantidade deverá ser dissolvida na água de bebida na proporção de 0,5 g de atividade por 1 litro de água e oferecida como única fonte de bebida até o consumo completo. Após, oferecer água de bebida não medicada pelo restante do dia.

Tratamento de DCR:

Linco-Spectin® 100

Administrar 50 mg de atividade antibiótica por kg de peso vivo por dia, aos primeiros sintomas da doença, e continuar por 3 a 7 dias. Essa quantidade deverá ser dissolvida na água de bebida na proporção de 0,5 g de atividade por 1 litro de água e oferecida como única fonte de bebida até o consumo completo. Após, oferecer água de bebida não medicada pelo restante do dia.

Perus:

Administrar 150 mg de atividade antibiótica por kg de peso vivo por dia, durante os 3 a 5 primeiros dias de vida. Essa quantidade deverá ser dissolvida na água de bebida na proporção de 0,5 g de atividade por 1 litro e oferecida como única fonte de bebida até o consumo completo. Após, oferecer água de bebida não medicada pelo restante do dia.

Suínos:

Dosagem recomendada: 10 mg/kg peso vivo por dia.

Administrar 63 mg de atividade antibiótica (21 mg de Lincomicina + 42 mg de Espectinomicina) por 1 litro de água de bebida. Administrar a água medicada como única fonte de bebida durante 4 a 7 dias. Para o controle e tratamento de ileíte, recomenda-se período de tratamento de 7 dias.

Exemplos para preparar:

Aves:

Idade	Quantidade LS 100	Nº aves de tratadas	Litros de água
1ª semana	1 pote	13.000	120 litros
4ª semana	1 pote	1.800	300 litros

Suínos:

Quantidade LS 100	Litros de água
1 pote	1500 litros

Restrição de uso:

Não administrar em aves de postura.

Não requer Período de Retirada do Produto antes do abate do animal.

Linco-Spectin[®] 100

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.652 e, 22/02/01.

Apresentação: Potes plásticos contendo 150 mg.