

Linco-Spectin® Solução Estérel
(Cloridrato de lincomicina+ sulfato de espectinomicina)

Uso Veterinário

EXCLUSIVAMENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM SUÍNOS, AVES, BEZERROS, OVINOS, CAPRINOS, CANINOS E FELINOS

Fórmula:

Cada mL contém:

Cloridrato de lincomicina (equiv. à Lincomicina base).....	50,00 mg
Sulfato de espectinomicina (equiv. à Espectinomicina base)	100,00 mg
Álcool benzílico	9,00 mg
Água para injeção q.s.p.	1,00 mL

Indicações:

Linco-Spectin® Solução Estérel é indicado para suínos, aves, bezerros, ovinos, caprinos, caninos e felinos. No tratamento de infecções causadas por germes sensíveis à lincomicina, tais como *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Clostridium*, *Mycoplasma* spp, *Treponema* e bactérias anaeróbicas, bem como por germes sensíveis à espectinomicina, como *Escherichia*, *Salmonella*, *Staphylococcus*, *Streptococcus* e Micoplasmas.

Suínos:

No tratamento de agentes patogênicos variados, especialmente diarreia de suínos, infecções micoplasmicas, enterite coliforme, artrite infecciosa e adjuvante no tratamento de erisipela.

Aves:

No tratamento de D.C.R. (Doença Crônica Respiratória) com ou sem infecções provocadas por *E. coli*. O tratamento com resultados altamente positivos incluem infecções por micoplasma, como D.C.R., aerosaculite e estafilocose aviária.

Bezerros:

No tratamento de pneumoenterites e pneumonia micoplasmica ou bacteriana.

Linco-Spectin® Solução Estéril (Cloridrato de lincomicina+ sulfato de espectinomicina)

Ovinos e caprinos:

No tratamento de doenças respiratórias causadas por *Mycoplasma* e bactérias.

Caninos:

No tratamento das infecções das vias respiratórias, afecções cutâneas e infecções das vias urinárias. As infecções tratadas com êxito por Linco-Spectin® incluem pneumonia, faringite, tonsilite, laringite, bronquite, dermatite piogênica, dermatite pustular, abscessos, cistite e metrite, sensíveis à lincomicina e à espectinomicina.

Felinos:

No tratamento das infecções das vias urinárias e respiratórias superiores, infecções localizadas, cistite, ferimentos infectados e abscessos, sensíveis à lincomicina e à espectinomicina.

Contra-indicações:

1. Linco-Spectin® é contra-indicado para os animais que demonstrem sensibilidade aos antibióticos da fórmula ou a um e outro, isoladamente.
2. Não deve ser administrado a coelhos, porquinhos-da-índia e chinchilas, por ter sido constatado que é prejudicial a estas espécies animais.

Precauções:

Linco-Spectin® deve ser usado com prudência em animais com sensibilidade acentuada aos antibióticos. Na eventual ocorrência de infecção grave, deverão ser tomadas as medidas apropriadas. Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Posologia:

Dose recomendada para suínos – administração exclusiva por via intramuscular:

1 ml para cada 10 kg de peso. Esta dose pode ser repetida a intervalos de 24 horas por um período não superior a 21 dias.

Linco-Spectin® Solução Estéril
(Cloridrato de lincomicina+ sulfato de espectinomicina)

Dose recomendada para aves – administração por vias subcutânea, intramuscular profunda ou oral:

0,1 mL para cada 0,5 kg de peso. Administrar por via subcutânea. Uma vez a cada 24 horas por 3 dias consecutivos ou injetar de uma só vez e continuar o tratamento por via oral, durante 3 a 5 dias.

Dose recomendada para bezerros – administração exclusiva por via intramuscular:

1 mL para cada 10 kg de peso.

Dose recomendada para ovinos e caprinos – administração exclusiva por via intramuscular:

1 mL para cada 10 kg de peso. Administrar uma vez a cada 24 horas por 3 dias.

Dose recomendada para caninos e felinos – administração exclusiva por via intramuscular:

1 mL para cada 5 kg de peso. Esta dose pode ser repetida a intervalos de 12 ou 24 horas por um período não superior a 21 dias.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 137 em 23/04/75.

Apresentação: Linco-Spectin® Solução Estéril é apresentado em embalagens individuais contendo frasco-ampolas de 10 mL ou 50 mL.