

## Lincomix<sup>®</sup> - 600

### **Uso Veterinário**

Para tratamento preventivo da enterite necrótica causada por *Clostridium perfringens* e anaeróbios em frangos de corte.

### **Composição:**

Cada 100 g contém:

Lincomicina base ..... 60,00 g

(na forma de cloridrato de lincomicina)

Excipiente q.s.p..... 100,00g

### **Importante:**

Misturar completamente à ração antes de usar. Depois de aberta, conservar a embalagem em lugar seco a fim de evitar formação de grumos. Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.

### **Modo de usar:**

Os níveis recomendados de lincomicina para prevenção da enterite necrótica são de 2,2g; 3,3 g ou 4,4 g por tonelada métrica de ração terminada. Para o uso de Lincomix<sup>®</sup> 600 (600 g/kg), recomenda-se preparar uma mistura inicial do produto com uma parcela pequena de ração ou de alguns dos seus ingredientes antes de adicionar ao volume total da ração terminada, para garantir uma melhor distribuição do ingrediente ativo.

Fazer a pré-mistura das quantidades abaixo de Lincomix<sup>®</sup> 600 com uma porção de ração para obter as seguintes concentrações finais depois de misturada ao volume total da mesma:

<b>Concentração final de lincomicina por tonelada métrica de ração terminada</b>	<b>Quantidade de Lincomix<sup>®</sup> 600 a ser adicionada por tonelada métrica de ração terminada</b>
2,2 g	3,6 g
3,3 g	5,5 g
4,4 g	7,2 g

Não é necessário suspender a administração da ração contendo Lincomix<sup>®</sup> 600 antes do abate das aves, desde que a concentração esteja nos níveis recomendados para a

## Lincomix<sup>®</sup> - 600

prevenção da enterite necrótica (2,2g a 4,4g de lincomicina por tonelada métrica de ração terminada).

### **Recomendações:**

Quando o Lincomix<sup>®</sup> 600 for usado na ração em combinação com coccidiostáticos ou produtos arsenicais que requeiram suspensão da administração antes do abate, deve-se respeitar o tempo de suspensão recomendado para estes produtos.

A inclusão deste preparado em alimentos de outras espécies animais que não sejam aves pode provocar efeitos gastrintestinais adversos.

As boas práticas de manufatura devem ser observadas na preparação de alimentos contendo este medicamento. Isto inclui procedimentos apropriados de limpeza, a fim de evitar contaminação cruzada.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 2110 em 12/11/84.

**Apresentação:** Barrica contendo 25 kg.