

Terramicina[®] Solução Injetável

Uso Veterinário

Características:

Terramicina[®] Solução Injetável é um produto pronto para uso, estável, à base de oxitetraciclina, antimicrobiano de amplo espectro, altamente ativo contra um grande número de microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, certas espécies de micoplasmas, riquetsias e protozoários.

Terramicina[®] Solução Injetável apresenta concentração de 50 mg de cloridrato de oxitetraciclina por mL, em veículos apropriados que garantem uma absorção rápida do princípio ativo. O produto é absolutamente estéril e não necessita de refrigeração.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de oxitetraciclina..... 5,0g*

Veículo q.s.p..... 100,0 mL

* 50 mL são equivalentes a 2,5 g de Terramicina.

Indicações:

Terramicina[®] Solução Injetável é indicada para o tratamento de infecções causadas por cepas sensíveis à oxitetraciclina nas espécies animais a seguir:

Bovinos: Para o tratamento de anaplasnose (*Anaplasma marginale*), carbúnculo sintomático (*Clostridium* sp), onfalite (*Streptococcus*, *Staphylococcus* sp), pneumonia (*Pasteurella multocida*, *Haemophilus* sp, *Mycoplasma* sp, *Bordetella* sp, *Klebsiella* sp), leptospirose (*Leptospira* sp), podridão do casco (foot-root), difteria, metrite, retenção de placenta, mastite sistêmica (*Pasteurella* sp, *Bacillus* sp, *Streptococcus* sp, *Klebsiella* sp, *Mycoplasma* sp, *Staphylococcus* sp), enterite bacteriana (*Escherichia coli*, *Salmonella* sp), actinobacilose (*Actinobacillus* sp), artrite infecciosa (*E.coli*, *Salmonella* sp), feridas infectadas, pericardite infecciosa, dermatofilose (*Dermatophilus congolensis*), queratoconjuntivite infecciosa (*Moraxella bovis*), carbúnculo hemático (*Bacillus anthracis*).

Auxiliar no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Equinos: Para o tratamento de pneumonia (*Streptococcus* sp, *E. coli*, *Actinobacillus equuli*, *Corynebacterium equi*), garrotilho (*Streptococcus equi*), artrites, infecções da pele, anexos e tecidos moles (metrite, onfaloflebite, mastites, abscessos) determinados por *Streptococcus* sp, *Corynebacterium* sp, *Fusobacterium necrophorum*.

Terramicina® Solução Injetável

Auxiliar no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-partos causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Suínos: Para o tratamento de pneumonia (*Pasteurella* sp, *Haemophilus* sp, *Mycoplasma* sp, *Bordetella bronchiseptica*), leptospirose (*Leptospira* sp), erisipela (*Erysipelothrix* sp), enterite bacteriana, artrite infecciosa e ferimentos infectados (*E.coli*, *Salmonella* sp), onfalites, onfaloflebites (*Streptococcus* sp, *Staphylococcus* sp).

Auxiliar no controle e prevenção da síndrome MMA (metrite-mastite-agalaxia) causadas por *E.coli* e *Salmonella* sp e na prevenção das infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Ovinos: Para o tratamento de pneumonia (*Pasteurella multocida*, *Mycoplasma* sp, *Haemophilus* sp), aborto enzoótico, podridão do casco (foot-root), mastite sistêmica, metrite, artrite infecciosa, pericardite infecciosa e feridas infecciosas, causadas por *Pasteurella multocida*, *Bacillus* sp, *Streptococcus* sp, *Klebsiella* sp e *Mycoplasma* sp. Auxiliar no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-partos causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Caprinos: Para o tratamento de pneumonia (*Pasteurella multocida*, *Mycoplasma* sp, *Haemophilus* sp), mastite sistêmica, podridão do casco (foot-root), pericardite infecciosa e feridas infecciosas, causadas por *Pasteurella multocida*, *Streptococcus* sp e *Klebsiella* sp.

Aves: Para o tratamento da Boubá Aviária e Doença Respiratória Crônica Complicada, causadas por *Mycoplasma gallisepticum* e *E.coli*.

Coelhos: Para o tratamento e prevenção de infecções causadas por *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *E. coli* e *Salmonella* sp.

Cães e gatos: pneumonia (*Pasteurella* sp, *Mycoplasma*), metrite (*E.coli*, *Staphylococcus* e *Streptococcus*), otite (*Streptococcus* sp), nefrite (*leptospira* sp), abscessos (*Corynebacterium* sp, *Streptococcus*), erlichiose (*erlichia canis*), infecções da pele e anexos.

Auxiliar no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-partos causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Modo de usar:

A Terramicina® Solução Injetável é indicada por vias intramuscular, subcutânea e por bloqueio no local da infecção. Utilizar técnicas de assepsia ao aplicar o produto.

Dosagens:

Grandes animais (bovinos e eqüinos): 3 a 5 mg/kg peso.

Terramicina[®] Solução Injetável

Médios animais (ovinos, caprinos e suínos): 6 a 8 mg/kg peso.

Pequenos animais (cães, gatos, coelhos e aves): 10 mg/kg peso.

Tabela de aplicação:

Grandes animais (bovinos e eqüinos):

Até 45 kg	3 a 4,5 mL
45 a 90 kg	3 a 9 mL
90 a 180 kg	9 a 18 mL
180 a 360 kg	18 a 36 mL

Médios animais (ovinos, caprinos e suínos):

Até 5 kg	1 mL
5 a 10 kg	1 a 2 mL
10 a 30 kg	2 a 6 mL
30 a 60 kg	6 a 8 mL
30 a 90 kg	8 a 10 mL

Pequenos animais (cães, gatos, coelhos e aves):

1 mL para 5 kg de peso.

Observações, período de carência e restrições de uso:

1. Guardar em lugar fresco e seco ao abrigo da luz solar, preferencialmente entre 15 e 30 °C.
2. As aplicações devem ser repetidas a cada intervalo de 24 horas, durante 3 dias.
3. A subdosagem interfere na eficácia do tratamento.
4. As dosagens podem ser modificadas a critério do médico veterinário.
5. Suspender a medicação 30 dias antes do abate dos animais para consumo humano.
6. Não administrar em fêmeas leiteiras lactantes.
7. Não administrar em aves produtoras de ovos para consumo humano.
8. O eventual escurecimento da Terramicina[®] Solução Injetável não interfere na sua eficácia.

Venda sob prescrição, aplicação e orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 1.630/60 em 04/08/60.

Apresentação: Frasco ampola de vidro âmbar contendo 10, 20 e 50 ml.